

저희 성심치과에는 오랜 경험의 의료진이 함께 합니다.

각 과의 전문의에 의한 전문과목별 진료를 시행하여
보다 정확한 진단과 치료로 최고의 만족을 드립니다.

대표 원장



대표원장 이광섭

- 경희대학교 치과대학 졸업
- 치의학 박사
- 경희대학교 치의학전문대학원 외래교수 역임
- 성남시 치과의사회 회장 역임



대표원장 안교진

- 서울대학교 치의학대학원 치의학 석사
- 분당서울대학교병원 인턴 및 구강악안면외과 레지던트 수료
- 보건복지부 인증 구강악안면외과 전문의
- 대한구강악안면외과학회 정회원
- 대한악안면(턱얼굴)성형재건외과학회 정회원 및 인정의
- 대한턱관절협회 정회원

보철과



보철과 이정만

- 경희대학교 치과대학 졸업
- 치의학 박사
- 경희대학교 치과병원 치과보철과 인턴 및 레지던트 수료
- 대한치과보철학회 정회원 및 인정의
- 강남병원 치과원장 역임
- 양천성모병원 치과원장 역임
- 경희대학교 치의학전문대학원 외래교수 역임



보철과 권수연

- 경희대학교 치과대학 치의학 석사
- 단국대학교 치과병원 인턴 수료
- 경희대학교 치과병원 치과보철과 레지던트 수료
- 보건복지부 인증 치과보철과 전문의
- 경희대학교 치과대학 치과보철과 외래부교수
- 대한치과보철학회 정회원 및 인정의



보철과 이미란

- 강릉원주대학교 치과대학 졸업
- 강릉원주대학교 치과대학 치과보철과 석사 졸업
- 강릉원주대학교 치과병원 치과보철과 인턴 및 레지던트 수료
- 강릉원주대학교 치과대학 외래강사

보존과



보존과 **유승현**

- 경희대학교 치의학전문대학원 석사
- 경희대학교 치과대학 치과보존학 박사과정
- 경희대학교 치과병원 인턴 및 치과보존과 레지던트 수료
- 보건복지부 인증 치과보존과 전문의
- 경희대학교 치과대학 치과보존과 외래부교수
- 대한치과보존학회 정회원 및 인정의



보존과 **이정민**


- 경희대학교 치의학전문대학원 석사
- 경희대학교 치과대학 치과보존학 박사
- 강동경희대학교 치과병원 인턴 및 치과보존과 레지던트 수료
- 보건복지부 인증 치과보존과 전문의
- 경희대학교 치과대학 치과보존과 외래부교수
- 대한치과보존학회 정회원 및 인정의

교정과



교정과 **박창욱**

- 대한치과교정학회 정회원
- 대한치과교정학회 인정의 (제761호)
- 대한설측교정학회 회원



주소 및 연락처

주소: 경기도 성남시 수정구 산성대로 263 (2층~3층)

전화: 031-747-4340

이메일: kjahn0308@naver.com

오는 방법

지하철: 지하철 8호선 신흥역 3번 출구에서 1분 거리

1Day 당일 임플란트

발치와 임플란트를 동시에 하루만에 모든게 해결!!



임플란트 치료기간의 비교

기존 임플란트	3~6개월	3~6개월	최종 보철물을 완성
	발치 후 치유기간	임플란트 수술 임시보철물	
당일 임플란트	당일 시술 후 3~4개월		

* 단순히 치료 기간의 단축만을 위하여 무리한 시술을 진행하지는 않습니다.
환자 개인의 잇몸 상태에 따라 적정한 시술 방법이 정해져지며 최종 목표는 임플란트의 높은 성공률과 장기간의 안정적인 예후에 초점을 맞추어 진행하고 있습니다.

당일 임플란트란?

발치즉시 임플란트라고 불리는 발치와 동시에 임플란트를 식립하는 술식을 말합니다. 기존의 임플란트는 발치 후 3~6개월의 치유기간을 가진 후 임플란트를 식립하고, 또 다시 3~6개월의 골 유착 기간을 가진 후에 최종 보철 시술을 했습니다. 반면 성심치과의 당일 임플란트는 수술횟수와 내원횟수, 그리고 치료기간을 대폭 단축시켜 드립니다.

무절개/최소절개 임플란트

출혈, 통증, 봇기가 거의 없는 임플란트!!

무절개/최소절개 임플란트란?



보통의 임플란트는 잇몸을 절개 후 임플란트를 식립하고 붕합을 하는 과정을 거칩니다. 성심치과에서는 첨단 장비에 의한 환자 개인 맞춤형 시술 및 속련된 전문의 시술로 잇몸을 절개하지 않거나 절개하더라도 최소 부위만 절개하고도 정확하고 안전한 임플란트 사립이 가능합니다. 수술 부위의 출혈과 통증 및 봇기가 거의 없어 바로 일상생활이 가능합니다.

* 치조골 상태가 매우 좋지 않아 대량의 골이식이 필요한 경우 무절개 시술 이제 한동안 수 있습니다. 환자가 확실 시하는 네비게이션 임플란트도 시술 가능합니다. 성심치과의 모든 진료는 최선의 결과에 초점을 맞추어 진행되며 불필요한 추가 시술 및 보여주기식의 진료는 경하거나 시행하지 않습니다.



고난도 임플란트

성심치과의 임플란트는?

성심치과의 모든 임플란트 수술은 많은 수술 경험을 가진 구강악안면과 전문의가 진단 및 시술을 합니다. 치아가 전혀 남지 않은 분들 혹은 임플란트가 불가능하다고 들으셨던 분들, 임플란트에 실패한 경험이 있으셨던 분들도 임플란트 사립이 가능하며, 대부분의 어려운 케이스에서 대학병원 의뢰없이 대학병원 전료이상의 결과를 보장합니다!!

임플란트 뼈이식은?

임플란트 뼈이식



임플란트를 식립하기에 잇몸뼈가 부족한 경우 혹은 염증으로 인해 잇몸뼈의 파괴가 큰 경우 단순한 치조골 이식술에서부터 상악동 거상술이나 블록골 이식술까지 필요한 경우가 있습니다. 환자분의 상태에 맞게 다양한 인공뼈를 적절히 사용할 수 있으며 본인의 치아를 이용한 자기이식이식재를 사용할 수도 있고 자기골을 채취하여 이식술을 시행하기도 합니다. 편안하고 빠르지만 확실한 수술을 추구하며 높은 뼈이식 성공률로 안정된 임플란트의 결과를 보장합니다.

임플란트 틀니란?

임플란트 틀니란



천체 틀니를 사용해야 하는데 틀니의 유지력이 좋지 않아 헬기는 경우에 상악에는 4개, 하악에는 2개의 임플란트를 식립하고, 그 위에 틀니를 부착하여 기존 틀니보다 튼튼하게 고정되며 빠질 염려가 없고 더 편안한 음식을 저작이 가능합니다.

심미적 임플란트란?

심미적 임플란트




임플란트에 연결하는 인공치아는 최신 CAD/CAM 장비를 사용하여 자연치아의 형태와 색상을 최대한 재현한 자르코니아 보철물을 사용합니다. 치아 상실 전의 자연치아에서의 치아 형태와 잇몸형태를 최대한 회복해드립니다.

구강외과(사랑니, 턱관절)

성심치과에서는 대학병원 진료가 필요한 고난도 사랑니 발치와 턱관절치료를 신속한 예약으로 즉각 해결해 드립니다.

맹출 중인 사랑니



사랑니란?

사랑니는 만 18세를 전후로 두번째 큰 어금니(제2대구치) 뒤쪽에서 나오는 세번째 큰 어금니를 말하며 제3대구치라고 하며 지치(智齒, wisdom tooth)라고 불리기도 합니다. 위아래 턱에 좌우로 총 4개가 있으며 전부 똑바로 나오는 사람도 있지만 턱뼈의 자리가 부족하여 기울어져 일부만 보이기도 하고 완전히 잇몸 속이나 턱뼈에 묻혀있는 경우도 있습니다. 많은 경우 턱뼈의 공간이 부족하여 기울어져 나오거나 완전히 묻히게 됩니다. 이 자체가 문제가 되지는 않으나 첫솔질을 하기가 힘들어 치아와 잇몸의 깨끗한 관리가 힘들게 되고 충치가 생기거나 잇몸에 염증이 생기기 쉬운 환경이 됩니다. 아무런 증상 없이 잇몸 속에 묻혀있는 사랑니는 그냥 놔두어도 무방하나 이렇게 문제를 일으키거나 불편한 느낌을 주는 사랑니는 뽑는 것이 추천됩니다.

수평 매복 사랑니



물리치료 장비

저출력레이저



경피신경전기자극치료기



Ethyl chloride - 분사신장요법



턱관절 장치

턱관절 안정장치



메탈교정

Metal Bracket



메탈교정이란?

가장 오래된 교정장치로 저렴한 가격이 장점.
하지만 가장 문제가 되는 것은 심미성입니다.
정밀도 및 효율성에 있어서는 가장 우수하며, 비용도
저렴하나 미관상 보기 좋지 않다는 단점이 있습니다.
치아에 붙어있는 금속 교정장치가 쉽게 눈에 띄어 부담을
느끼시는 환자분들이 많이 계시니까요.
메탈교정은 심미성이 중요하지 않은 부분교정이나
소아교정에 많이 사용됩니다.

레진교정

Resin Bracket

레진교정이란?

메탈교정과 모든 방식이 동일하나 브라켓의 재질이 세라믹
또는 레진으로 이루어져 심미성을 대폭 향상시킨 교정장치
입니다. 치아와 유사한 색을 띠는 장점이 있지만 단점도
있습니다. 레진이 갖는 최대 단점인 강도 와 칙색의 문제가
있습니다. 레진은 플라스틱으로 치아의 변형이나 칙색이
쉽게 되기도 합니다.



세라믹교정

Ceramic Bracket

세라믹교정이란?


세라믹은 미술적이 높고 자연치아와 대형될 때 치아가
갈린다는 단점이 있지만, 그럼에도 심미성이 좋고
착색이나 변형이 없기 때문에 최근들어 가장 대중적인
치아 교정장치로 환자분들의 선호도가 상당히 높습니다.



자가결찰교정

자가결찰 교정이란?

철사, 고무줄 등으로 브라켓과 와이어가 꽁꽁 묶인
일반교정과 달리 자가결찰교정은 브라켓과 와이어간의
마찰력을 최소화하게 됩니다. 마찰력으로 소실되는 힘이
온전히 견인력으로 적용할 수 있으므로, 따라서
자가결찰교정은 치아의 이동을 빠르게 하여
치아교정기간을 줄이고 또 통증까지도 줄여줄 수 있는
것입니다. 자가결찰 시스템을 이용하여 일반 치아교정보다
심미성이 우수하고, 교정 치료 기간이 단축되기 때문에
'급속교정'이라 부르기도 합니다.
클리피씨 브라켓은 와이어와 브라켓 클립의 Activation에
의해 3단계 (PASSIVE, INTERACTIVE, ACTIVE)로
분류됩니다. 치아 초기부터 마지막까지 각각의 단계에
맞는 STAGE를 선택함으로써 적절한 치료를 할 수
있습니다.



투명교정

투명교정이란?



설측교정

설측교정이란?

설측교정은 치아의 바깥쪽이 아닌 안쪽으로 치치를
부착하는 형태의 교정입니다. 대표적으로 인코그니토,
하모니, 클리파엘 등의 교정장치가 있는데 골으로는 전혀
보이지 않아 심미성에서 가장 높은 점수를 줄 수 있습니다.
하지만 골에서 안보이니라는 장점을 제외하고는 나머지는
순측교정에 비해 단점입니다. 치치가 맞춤 제작이므로
비용이 높은 편이며, 입 안쪽에서 느끼지는 이물감, 발음의
문제, 치료기간의 연장 등 설측교정이 안고 있는 속명이라
할 수 있겠네요.



청소년 및 성인교정

심미교정

청소년 교정의 장점



- ▶ 교정치료의 효과와 효율이 가장 좋은 시기입니다.
유치와 영구치가 교환하는 시기이므로, 치아가 맹출하는
힘을 이용하여 효율적인 치료가 될 수 있습니다.
- ▶ 빠르고 안정적인 결과를 얻을 수 있습니다.
- ▶ 치아와 잇몸조직의 성장을 통하여 치열교정이 되므로
주변 잇몸조직의 건강에 좋습니다.
- ▶ 사회성과 대인관계 형성에 자신감을 부여하여 성장기
성격 형성에 긍정적 도움이 됩니다.

노인교정

치주교정

노인교정이 필요한 이유



- ▶ 교정치료에 있어서 나이에 대한 한계는 없습니다.
- ▶ 나이가 들면서 본인의 문제점에 대해 더 잘 알고 있기
때문에 치료의 만족도가 높습니다.
- ▶ 교정치료를 통해 오랜 꿈틀레스를 해결하고 더
자신있게 웃을 수 있습니다.
- ▶ 더 젊어, 더 자신있게 이미지를 개선할 수 있습니다.
- ▶ 치아를 더욱 오래 건강하게 유지할 수 있어서 식사의
불편함을 줄일 수 있습니다.

보철치료

보철치료란?

치주질환이나 치아 우식으로 인해 치아가 빠져게 되었을 때, 음식 먹기와 복지에 두가 됩니다. 물은 빠진 치아수가 많아지게 되면 막기도 힘들어지고 치아가 있던 자리가 비게 되어 그 치아가 지지하고 있던 균육이나 피부들이 처지게 되어 안모도 달라질 수 있습니다. 따라서 이가 빠지면 빠른 시일 안에 조치를 취해야 하는데 이것이 보철 치료이며 상황에 따라 여러 방법이 있습니다.

크라운

크라운이란?



브릿지

브릿지란?

브릿지는 치아가 상실된 경우 양 옆의 치아를 깨고 치아가 없는 부위에 의지를 넣어 다리(Bridge)처럼 연결해서 써우는 방법으로 치아 결손부위를 수복해주는 치료법입니다.



브릿지의 장점

- ▶ 임플란트에 비해 치료기간이 훨씬 짧습니다.
- ▶ 잇몸뼈가 부족한 경우에도 치료가 가능합니다.

브릿지의 단점

- ▶ 치아 결손 부위 양 옆으로 치아가 있어야 시술이 가능합니다.
- ▶ 양 옆의 치아를 깨어야 하는 단점이 있습니다.

인레이

인레이란?



종류

종류를 제거한 뒤 본을 떠서 보형물을 만들어 충치제거 부위를 채워 중으로써 치아의 형태와 기능을 회복시켜주는 치료입니다.

레진인레이(Tescera)

- ▶ 기존의 치아와 색상이 비슷하여 심미적으로 우수합니다.
- ▶ 아밀경이나 금보다 삭제량이 적어 치아를 최대한 보존할 수 있습니다.

골드인레이

- ▶ 충치 부위가 넓거나 씹는 힘이 강한 어금니 부위에 적합합니다.
- ▶ 치아의 손상 부위가 넓어도 치료가 가능합니다.
- ▶ 다른 재료보다 긴 수명을 가집니다.
- ▶ 인레이 무해하며 부식이 없고 강도가 자연치와 유사합니다.
- ▶ 가장 일반적으로 사용되는 부작용이 적은 치료법입니다.

심미보철

심미보철이란?

앞니치아성형은 최근 많은 연예인들이 선택하는 연예인 치아성형으로 치아를 삭제한 후 심미적인 보철물을 이용하여 치아를 고르게 배열하는 보철치료입니다. 장기간의 교정치료에 대한 부담이 있는 환자분들이나 치아의 형태 및 색상에 대한 치치도 필요한 경우에 유용한 치료입니다.

앞니치아성형의 종류

라미네이트



앞니가 벌어져 있거나, 악간 비뚤어져 있는 경우에 치아의 앞쪽을 최소한 삭제하여 그 부위에 넓고, 두명한 도재판을 붙이는 방법으로 1주일만에 앞니를 교정한 효과가 있습니다.

을세라믹

을세라믹



기존의 앞니 보형물은 금속관에 치아색깔의 도재를 입혀서, 색이 턱해보이거나, 치아 변연에 금속이 비쳐 보일 수 있으나, 은세라믹은 색감이 자연치에 가까워 옆 치아와 거의 구분하기 힘듭니다.

레진

치아에 직접 묻는 치아색의 특수 플라스틱 재료(레진)을 치아에 붙여 치아 모양과 색을 재현성 합니다. 당일 1회 치료 종료가 가능하고, 치아를 깨지 않는 장점이 있으나, 재료의 특성상 시간이 지남에 따라 변색의 우려가 있습니다.

봉사활동

- ▶ 성심치과는 정기적인 의료봉사를 통해 지역사회 보건의료에 기여하고자 노력하고 있습니다.
- ▶ 현재 성남 소망재활원에 월 1회 정기적인 의료봉사 지원을 후원하고 있습니다.

제목

봉사활동2

